

FACULTÉ DE MÉDECINE DE PARIS

ANNÉE 1970

THÈSE

N°

POUR

LE DOCTORAT EN MÉDECINE

(DIPLOME D'ÉTAT)

PAR

Marie, France CLAVIER

Née le 19 Décembre 1940, à Paris

Présentée et soutenue publiquement le

1970

**IRIDECTOMIE FILTRANTE
TYPE SCHEIE**

Indications et résultats

Président : M. OFFRET, Professeur

PARIS — 1970

FACULTÉ DE MÉDECINE DE PARIS

ANNÉE 1970

THÈSE

N°

POUR

LE DOCTORAT EN MÉDECINE

(DIPLOME D'ÉTAT)

PAR

Marie, France CLAVIER

Née le 19 Décembre 1940, à Paris

Présentée et soutenue publiquement le

197

**IRIDECTOMIE FILTRANTE
TYPE SCHEIE**

Indications et résultats

Président : M. OFFRET, Professeur

PARIS — 1970



A MES PARENTS

avec toute ma tendresse


A MA SOEUR

A MON FRERE

A TOUS LES MIENS

A TOUS MES AMIS

en témoignage de mon affection.



Digitized by the Internet Archive
in 2026

https://archive.org/details/IA41550207_0028

A NOTRE MAITRE ET PRESIDENT DE THESE

MONSIEUR LE PROFESSEUR Guy OFFRET

Professeur de Clinique Ophtalmologique à la

Faculté de Paris

Ophtalmologiste des Hôpitaux

Chevalier de la Légion d'Honneur

Qui nous a fait profiter de son
enseignement durant notre passage dans
son service.

Qui nous a fait le grand honneur de
présider cette thèse.

Qu'il trouve ici le témoignage de notre
profonde reconnaissance.

A NOTRE MAÎTRE ET PRÉSIDENT DE THÈSE

MONSIEUR LE PROFESSEUR GUY ORFÈVRE

Professeur de Chimie Ophtholomique à la

Faculté de Paris

Ophthalmologiste des Hôpitaux

Chevalier de la Légion d'Honneur

Qui nous a fait profiter de son

enseignement durant votre passage dans

son service.

Qui nous a fait le grand honneur de

présider cette thèse.

Qu'il trouve ici le témoignage de notre

profonde reconnaissance.

A MADAME LE DOCTEUR G. BRUN-VALLON

A MONSIEUR LE PROFESSEUR AGREGÉ POULIQUEN

Il nous a inspiré cette thèse.
Nous le remercions de l'intérêt
qu'il a bien voulu nous témoigner
en nous guidant dans notre spécialité.
Qu'il soit assuré de notre respec-
tueux attachement.

AUX ORTHOPÉDISTES DU CENTRE HOSPITALIER DE VERSAILLES

A MONSIEUR LE DOCTEUR DEMAILLY

MONSIEUR LE DOCTEUR J.M.C. HENRI

MADAME LE DOCTEUR P. ...
Il nous a guidé dans sa réalisation
avec nos remerciements, l'expression
de notre sincère reconnaissance.

A NOS MAÎTRES DE LA FACULTÉ ET DES HÔPITAUX

Notre reconnaissance profonde pour leur
précieux enseignement.

A L'INSTITUT CHIRURGICAL

Il nous a considérablement aidé en mettant
son remarquable service de documentation
bibliographique à notre disposition.
Nous l'en remercions vivement.

A MONSIEUR LE PROFESSEUR AGREGÉ POUTIQUEN

Il nous a inspiré cette thèse.

Nous le remercions de l'intérêt

qu'il a bien voulu nous témoigner

en nous guidant dans notre spécialité.

Qu'il soit assuré de notre respec-

teux attachement.

A MONSIEUR LE DOCTEUR DEMATTEY

Il nous a guidé dans sa réalisation

avec ses remerciements, l'expression

de notre sincère reconnaissance.

A MADAME LE DOCTEUR S. BRAUN-VALLON

Ophthlalmologiste des Hôpitaux

Elle fut notre premier Maître en Ophtal-
mologie et nous fit apprécier la noblesse
de cette discipline.

Qu'elle trouve ici l'expression de notre
respectueuse admiration et de notre
sincère gratitude.

AUX OPHTALMOLOGISTES DU CENTRE HOSPITALIER DE VERSAILLES

MONSIEUR LE DOCTEUR P. PLESSIER

MONSIEUR LE DOCTEUR J.M.G. HENRY

MADAME LE DOCTEUR F. BOIGE DOUCET

A NOS MAITRES DE LA FACULTE ET DES HOPITAUX

Notre reconnaissance profonde pour leur
précieux enseignement.

A L'INSTITUT CHIBRET

Il nous a considérablement aidé en mettant
son remarquable service de documentation
bibliographique à notre disposition.
Nous l'en remercions vivement.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

CHICAGO, ILLINOIS 60637

Dear Mr. [Name]:

I am writing to you regarding the [Topic].

I am sorry that

the [Topic] is not as [Topic].

I am sure that you will find this [Topic].

I am sure that you will find this [Topic].

I am sure that you will find this [Topic].

I am sure that you will find this [Topic].

I am sure that you will find this [Topic].

I am sure that you will find this [Topic].

I am sure that you will find this [Topic].

I am sure that you will find this [Topic].

I am sure that you will find this [Topic].

I am sure that you will find this [Topic].

I am sure that you will find this [Topic].

I am sure that you will find this [Topic].

I am sure that you will find this [Topic].

I am sure that you will find this [Topic].

P L A N

1. Définition
2. Historique : - Preziosi
- principaux auteurs
3. Indications
4. Techniques : - classique décrite par Scheie
- variantes : . Malbran
 . Mac Lean
 . Liu Ying Ch'i
5. Applications à des cas particuliers :
- glaucome et cataracte
- glaucome congénital
- glaucome de l'aphake
- glaucome hémorragique
6. Technique adoptée dans le service
7. Résultats des auteurs
8. Résultats du service
9. Conclusion.

INTRODUCTION

— — — — —

L'iridectomie filtrante connue sous le nom d'intervention de Scheie constitue une intervention fistulisante anti-glaucomeuse au même titre que l'iridencleisis et la trépanation d'Elliot.

Elle associe d'une part une iridectomie basale,
d'autre part une fistule par galvanocautérisation des lèvres
de l'incision sclérale.

Sa simplicité autant que son efficacité lui ont valu d'être adoptée par de nombreux chirurgiens, dont certains ont d'ailleurs décrit quelques variantes.

Source: www.irs.gov

H I S T O R I Q U E

— : — : — : — : — : — : — : — : — : —

Si dès 1856 von Graefe découvre que l'iridectomie peut guérir le glaucome, c'est en fait à Préziosi (1924) que l'on doit la première iridectomie filtrante, pratiquée à l'aide d'un cautère.

Sa technique était la suivante :

- désinfection et cocaïnisation de l'oeil, dissection d'un lambeau conjonctival;
- application d'un électrocautère dont la pointe est rougie au niveau de la jonction cornéolimnique vers l'angle de la chambre antérieure;
- le cautère est appliqué plusieurs fois jusqu'à ce que l'on observe une issue d'humeur aqueuse au niveau de la plaie;
- le lambeau conjonctival est remis en place et fixé en cinq points;
- l'intervention est terminée.

Scheie (1958) a repris le procédé en l'améliorant. C'est sa technique que nous décrirons.

Par la suite la technique a subi de nombreuses modifications

- Malbran
- Mac Lean
- Liu Ying Ch'i

[illegible]

RECEIVED 1941 JUN 10 10 10 AM

TO THE DIRECTOR, BUREAU OF AERONAUTICS

FROM THE CHIEF, BUREAU OF AERONAUTICS

SUBJECT: AIRCRAFT ENGINEERING

RE: AIRCRAFT ENGINEERING

1. The following information is being furnished to you for your information.

2. The following information is being furnished to you for your information.

3. The following information is being furnished to you for your information.

4. The following information is being furnished to you for your information.

5. The following information is being furnished to you for your information.

6. The following information is being furnished to you for your information.

7. The following information is being furnished to you for your information.

8. The following information is being furnished to you for your information.

9. The following information is being furnished to you for your information.

10. The following information is being furnished to you for your information.

11. The following information is being furnished to you for your information.

12. The following information is being furnished to you for your information.

INDICATIONS

[illegible]

A la lumière des travaux de la littérature, l'intervention de Scheie s'applique pratiquement à tous les types de glaucome.

Glaucome primitif

1. Le glaucome par fermeture de l'angle représente une indication de choix : soit que le glaucome soit passé à la chronicité et que l'angle reste constamment fermé, soit qu'après une crise aiguë ou sub-aiguë persiste une tonographie perturbée et des goniosynéchies assez étendues pour contre-indiquer une iridectomie périphérique simple. En effet l'angle étroit de ce type de glaucome fait déconseiller la sclérectomie ou la trépanation d'Elliot. Quant à l'iridenclesis, si son indication demeure, elle peut être tempérée par l'existence d'une réaction irienne congestive importante ou d'une atrophie de l'iris rendant la fistulisation par la mèche irienne très aléatoire.

2. Dans le glaucome chronique simple, l'indication est la même que celle d'une trépanation d'Elliot ou d'un iridenclesis. Elle peut toutefois se faire même en présence d'un iris atrophique.

3. Dans le glaucome congénital une intervention de Scheie a pu donner de bons résultats là où la goniotomie

[illegible]

n'était pas praticable ou n'avait pas donné les résultats escomptés. L'iridectomie filtrante peut être indiquée dans le glaucome de l'aphake et aussi dans l'intervention associant l'extraction de la cataracte comme intervention anti-glaucomateuse.

L'intervention de Scheie garde des indications limitées dans les glaucomes secondaires post-uvéites, dans les glaucomes hémorragiques en raison de la réaction inflammatoire et hémorragique qui succède très souvent à ce type d'intervention.

et tenez-vous bien, car c'est la dernière fois que
je vous en parle. Je vous en parle parce que je
sais que vous ne le ferez pas. Je vous en parle
parce que je sais que vous ne le ferez pas. Je vous en
parle parce que je sais que vous ne le ferez pas.

Je vous en parle parce que je sais que vous ne le ferez pas.
Je vous en parle parce que je sais que vous ne le ferez pas.
Je vous en parle parce que je sais que vous ne le ferez pas.
Je vous en parle parce que je sais que vous ne le ferez pas.

TECHNIQUES

— • — • — • — • — • — • —

TECHNIQUE CLASSIQUE DECRITE PAR SCHEIE

Le principe de la galvano-cautérisation de Scheie est d'obtenir par chauffage une rétraction des lèvres de la sclérotomie et une ouverture durable entre chambre antérieure et l'espace sous-conjonctival. On associe la cautérisation et l'iridectomie périphérique pour éviter un prolapsus irien et l'obstruction de la plaie par l'iris. La technique de Scheie est la suivante (1958) :

- L'intervention est pratiquée sous anesthésie générale ou sous anesthésie locale avec akinésie et rétro-bulbaire.

- On place un fil de traction dans le droit supérieur. Pour mieux pratiquer la dissection du lambeau conjonctival on infiltre la conjonctive par du sérum ou de la procaïne.

- On prépare un lambeau conjonctival classique et généralement dans un quadrant temporal supérieur ou inférieur. Le lambeau est disséqué au ras de la sclère et jusqu'au limbe sans poursuivre dans les lames cornéennes.

- A un millimètre environ en arrière de l'insertion du lambeau, à la limite de la cornée transparente et de la sclérotique, on amorce au cautère d'Hildreth la sclérotomie sur une longueur de trois à quatre millimètres et parallèle au limbe.

Une incision est faite sur la zone cautérisée perpendiculairement à la surface de la sclère en direction de l'angle de la chambre antérieure. Le cautère est de nouveau appliqué sur les lèvres de l'incision sclérale pour créer une rétraction d'au moins un millimètre des bords de la plaie. La cautérisation est généralement plus étendue au niveau de la lèvre postérieure que de la lèvre antérieure. La cautérisation est ainsi poursuivie alternant avec l'incision de la sclère au couteau de Parker ou au scarificateur de Desmarre jusqu'au plan descémétique. L'ouverture de la chambre antérieure est pratiquée au couteau. On fait bailler discrètement l'orifice de sclérotomie en faisant pression légèrement sur la sclère en arrière afin que l'iris fasse hernie. On pratique une iridectomie périphérique. On tapote à l'aide de la spatule la cornée pour que la pupille reprenne sa forme normale.

Parfois l'iris ne vient pas spontanément surtout lorsque l'angle est large et ouvert (Scheie) et on est obligé d'introduire une pince dans la chambre antérieure pour tirer au dehors la racine de l'iris.

La plaie conjonctivo-ténonienne est alors refermée par une suture continue au catgut en veillant bien à charger sur l'aiguille capsule de Tenon et conjonctive. Pour Scheie aucun médicament n'est instillé. On met un pansement mono-

culaire. La réaction inflammatoire est légère et il n'est pas nécessaire d'instiller des mydriatiques après intervention.

VARIANTES

1. MALBRAN (1959)

Elle est très comparable à la précédente et ne diffère que par l'utilisation de la diathermo-coagulation. On fait bailler les deux lèvres de l'incision par application d'une boule diathermique à chacune de ses extrémités, puis on coagule les lèvres à l'aiguille diathermique en insistant plutôt sur la lèvre postérieure.

Une iridectomie est faite aux ciseaux. Malbran conseille le pansement binoculaire pendant vingt quatre heures et des soins post-opératoires : Néomycine Hydrocortisone localement, et un mydriatique faible.

2. MAC LEAN

La technique de Mac Lean diffère en fait assez peu de la technique de Scheie, au moins dans son application au glaucome par fermeture de l'angle. La largeur du lambeau doit être de six à sept millimètres, le sillon doit être pratiqué à la partie postérieure du limbe et avoir de cinq à six millimètres. La cautérisation est stoppée avant de pénétrer dans la chambre antérieure.

1. The first part of the document is a list of names and dates, which appears to be a record of some kind. The names are written in a cursive script, and the dates are in a more formal, printed style. The list is organized into two columns, with names on the left and dates on the right.

(P281) T.L.S. LAM

1941

Mac Lean ne suture pas le plan ténonien mais seulement le plan conjonctival.

Une autre variante proposée par Mac Lean est l'association d'une cautérisation limbique et d'un iridenclesis particulièrement dans le cas de glaucome par fermeture de l'angle non contrôlé.

La cautérisation est appliquée dans la moitié droite du sillon puis l'ouverture de la chambre antérieure est pratiquée au couteau sur toute la longueur de l'incision. Le pilier irien est alors inclus dans la moitié gauche de la plaie.

3. LIU YING CH'I (1964)

LIU YING CH'I pratique à la manière de Malbran une diathermocoagulation (par deux rangées de diathermo coagulation mais seulement de la lèvre postérieure). Il estime en effet que la diathermocoagulation de la lèvre antérieure expose à une brûlure du lambeau conjonctival ou une opacité cornéenne en regard de la fistule.

4. MELLER

Il propose en outre d'introduire à chaque extrémité de l'incision une spatule à cyclodialyse pour libérer d'éventuelles goniosynéchies.

...the
... ..

... ..
... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..
... ..
... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..
... ..

1. The first part of the report is devoted to a general survey of the situation in the country.

2. The second part of the report is devoted to a detailed analysis of the situation in the country.

3. The third part of the report is devoted to a detailed analysis of the situation in the country.

4. The fourth part of the report is devoted to a detailed analysis of the situation in the country.

5. The fifth part of the report is devoted to a detailed analysis of the situation in the country.

6. The sixth part of the report is devoted to a detailed analysis of the situation in the country.

7. The seventh part of the report is devoted to a detailed analysis of the situation in the country.

8. The eighth part of the report is devoted to a detailed analysis of the situation in the country.

9. The ninth part of the report is devoted to a detailed analysis of the situation in the country.

10. The tenth part of the report is devoted to a detailed analysis of the situation in the country.

11. The eleventh part of the report is devoted to a detailed analysis of the situation in the country.

12. The twelfth part of the report is devoted to a detailed analysis of the situation in the country.

13. The thirteenth part of the report is devoted to a detailed analysis of the situation in the country.

14. The fourteenth part of the report is devoted to a detailed analysis of the situation in the country.

15. The fifteenth part of the report is devoted to a detailed analysis of the situation in the country.

16. The sixteenth part of the report is devoted to a detailed analysis of the situation in the country.

17. The seventeenth part of the report is devoted to a detailed analysis of the situation in the country.

18. The eighteenth part of the report is devoted to a detailed analysis of the situation in the country.

19. The nineteenth part of the report is devoted to a detailed analysis of the situation in the country.

20. The twentieth part of the report is devoted to a detailed analysis of the situation in the country.

21. The twenty-first part of the report is devoted to a detailed analysis of the situation in the country.

22. The twenty-second part of the report is devoted to a detailed analysis of the situation in the country.

- Mise en place de deux sutures cornéo-sclérales à 1 et 2 h.
- Iridectomie totale.
- Extraction du cristallin.
- Suture de l'incision.
- Points séparés à la soie pour fermer la conjonctive.
- Injection sous-conjonctivale d'hydrocortisone à 6 h.

BANGERTER préconise la mise en place de 3 sutures cornéo-sclérales à 10h.30, 1h.30 et midi.

A mi-distance entre deux sutures consécutives on fait une iridectomie basale puis les bords de la base sont cautérisés avec la boule du cautère en regard des iridectomies.

La sclère se rétracte, le cristallin étant ensuite extrait à la pince après zonulysse enzymatique.

Les fils sont serrés avec un surjet sur le lambeau conjonctival.

2. GLAUCOME CONGENITAL

La cautérisation limbique ne peut supplanter la goniotomie. Elle est donc indiquée en cas d'échec de cette dernière intervention, ou lorsque celle-ci est impossible en présence d'une cornée oedémateuse.

Pour Scheie la cautérisation est très difficile si elle est faite lorsque l'incision limbique est très avancée, car la sclère est mince et l'on risque d'ouvrir la chambre antérieure avant d'avoir obtenu une cautérisation efficace

1. The first part of the report deals with the general situation of the country and the results of the survey.

2. The second part deals with the results of the survey.

3. The third part deals with the results of the survey.

4. The fourth part deals with the results of the survey.

5. The fifth part deals with the results of the survey.

6. The sixth part deals with the results of the survey.

7. The seventh part deals with the results of the survey.

8. The eighth part deals with the results of the survey.

9. The ninth part deals with the results of the survey.

10. The tenth part deals with the results of the survey.

11. The eleventh part deals with the results of the survey.

12. The twelfth part deals with the results of the survey.

13. The thirteenth part deals with the results of the survey.

14. The fourteenth part deals with the results of the survey.

15. The fifteenth part deals with the results of the survey.

16. The sixteenth part deals with the results of the survey.

17. The seventeenth part deals with the results of the survey.

18. The eighteenth part deals with the results of the survey.

19. The nineteenth part deals with the results of the survey.

20. The twentieth part deals with the results of the survey.

21. The twenty-first part deals with the results of the survey.

22. The twenty-second part deals with the results of the survey.

23. The twenty-third part deals with the results of the survey.

et il y a généralement une quantité importante d'humeur aqueuse qui s'échappe, aussi applique-t-il le cautère en balayant le long du limbe jusqu'à ce qu'il y ait fuite d'humeur aqueuse. L'iridectomie doit être faite très prudemment en raison du risque possible de perte du vitré.

Mac Lean adopte à peu près la même technique. Il insiste sur le fait que l'ouverture de la chambre antérieure doit être faite au cautère et que toute cautérisation doit être stoppée dès qu'il y a issue d'humeur aqueuse même si l'orifice de filtration n'est pas très large. Pour Mac Lean, en effet, l'ouverture de la fistule s'élargit dans les jours suivants. Il ne pratique pas d'iridectomie qu'il trouve inutile et qui pour lui affaiblit la charpente sclérale déjà étirée et vulnérable.

3. GLAUCOME DE L'APHAKE

L'indication a été portée par Mac Lean en l'absence de vitré dans la chambre antérieure. L'incision doit être antérieure, à un demi millimètre en arrière de la base du lambeau. L'ouverture de la chambre antérieure est pratiquée avec la pointe du cautère comme pour le glaucome congénital. L'iridectomie n'est pas faite pour éviter au maximum le risque d'issue de vitré.

4. GLAUCOME HÉMORRAGIQUE

L'iridectomie filtrante a été proposée par Farnarier et Rampin dans le glaucome hémorragique. Encore faut-il choisir la zone de l'angle la moins vascularisée. Le risque hémorragique survient essentiellement au moment de l'iridectomie, aussi les auteurs utilisent-ils le procédé d'Ellis Thompson qui consiste à saisir l'iris à la pince et à appliquer sur celle-ci l'électrode diathermique de manière à coaguler la zone de section de l'iris. Pour Farnarier cette intervention a non seulement une action antalgique mais dans un certain nombre de cas une action hypotensive réelle.

3 - L'injection sous-conjonctivale de cortisone en fin d'intervention

Elle nous paraît essentielle en raison du risque inflammatoire provoqué par le chauffage de la sclère, risquant d'amener dans les suites un tissu conjonctif cicatriciel compromettant la filtration.

Nous préférons injecter du Soludécadron au niveau même de la bulle de filtration après avoir terminé le surjet conjonctival et à l'aide d'une aiguille très fine pour ponction de chambre antérieure. Elle permet en outre de gonfler la bulle conjonctivale et d'amorcer la filtration.

4 - Soins post-opératoires

- Atropine collyre pendant un mois.
- Traitement corticoïde local pendant un mois, général pendant cinq jours.

RESULTATS DES AUTEURS

SCHEIE

SUR 215 YEUX

TYPE DE GLAUCOME	Nombre d'yeux	R E S U L T A T S			
		Tension oculaire contrôlée			Echec
		Normalisée	Hypotonie	%	
ANGLE	. <u>Aigus</u> <u>négligés</u>	24	23	0	1
ETROIT	. <u>Chronique</u> -1°interv.	49	26	7	16
	-interv. anté- rieure	5	5	0	0
TOTAL		78	54	7	78 % 17
CHRO- NIQUE	. <u>Angle</u> <u>étroit</u> -1°opérat.	61	38	9	14
	-interv. anté- rieure	8	6	2	0
SIMPLE.	. <u>Angle</u> <u>large</u> -1°opérat.	64	42	14	8
	-interv. anté- rieure	4	4	0	0
TOTAL		137	90	25	84 % 22
TOTAL GENERAL		215	144	32	82 % 39 (18 %)

UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE

REPORT OF THE COMMISSIONER OF THE GENERAL LAND OFFICE

1900

WASHINGTON, D. C.

STATE OF TEXAS

1900

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

BOUNDS G.W. MINTON L.R. et LYLE P.L.

105 YEUX Iridectomie + cautérisation sclérale.

TABEAU 1 Résultats globaux

Contrôlés	87,6 %
Avec hypotonie	18 %
Contrôle sans myotique	73,03%
Echecs	12,4 %

TABEAU 2 Résultats dans glaucome par fermeture de l'angle

Angle étroit	Nb. Patients	Contrôlés	Contrôlés sans thérapeutique	Echec
aigu	21	17 80,8 %	16	4 19 %
chronique	32	28 87,5 %	25	4 12,5%

TABEAU 3 Résultats dans les autres types de glaucome

Type glaucome	Patients	Contrôlés	Contrôlés sans thérapeutique	Echec
gl. chronique simple	40	35 87,5 %	8	5
secondaire				
aphake	3	3	2	0
uvéites	2	2	2	0
trauma	1	1	0	0
hémorragique	1	0	0	1
congénital	3	3	3	0
juvénile	2	2	2	0

... ..

... ..

...	...	...	...	...
...	...	...	...	...

...	...	...	...	...
...	...	...	...	...
...	...	...	...	...
...	...	...	...	...
...	...	...	...	...

TABLEAU 4 Résultats suivant la race

Race	Patients	Contrôlés	Contrôlés sans traitement	Echec
Blanche	82	71	66	11
Noire	23	19	14	4

TABLEAU 5 Complications per et post-opératoires

Complications	Patients	Contrôlés	Contrôlés sans traitement	Echec
Retard formation C.A.	11 / 10 %	7	4	4
Hyphema	11 / 10 %	9	7	2
Mauvaise fistule	17 / 16 %	10	4	7
D.R.	2 / 1 %	2	2	0
Opacification cristallin	19 / 18 %	17	13	2
Infection oculaire	2 / 1 %	1	1	1

Year	Amount	Balance	Interest	Total
1911	100.00	100.00	0.00	100.00
1912	100.00	200.00	0.00	200.00
1913	100.00	300.00	0.00	300.00
1914	100.00	400.00	0.00	400.00
1915	100.00	500.00	0.00	500.00
1916	100.00	600.00	0.00	600.00
1917	100.00	700.00	0.00	700.00
1918	100.00	800.00	0.00	800.00
1919	100.00	900.00	0.00	900.00
1920	100.00	1000.00	0.00	1000.00

Year	Amount	Balance	Interest	Total
1921	100.00	1100.00	0.00	1100.00
1922	100.00	1200.00	0.00	1200.00
1923	100.00	1300.00	0.00	1300.00
1924	100.00	1400.00	0.00	1400.00
1925	100.00	1500.00	0.00	1500.00
1926	100.00	1600.00	0.00	1600.00
1927	100.00	1700.00	0.00	1700.00
1928	100.00	1800.00	0.00	1800.00
1929	100.00	1900.00	0.00	1900.00
1930	100.00	2000.00	0.00	2000.00

MALBRAN NORBIS

SUR 461 CAS

Type glaucome	Nb. Yeux opérés	Bons résultats	Bons résultats avec traitement	Echec
Angle fermé	165	127 77 %	15 9 %	23 14 %
Angle ouvert	277	225 81 %	15 5 %	37 14 %

London	reticular and granular	granular and reticular	granular and reticular	granular and reticular
Paris	granular and reticular	granular and reticular	granular and reticular	granular and reticular
Amsterdam	granular and reticular	granular and reticular	granular and reticular	granular and reticular

SCHEIE

TABEAU COMPARATIF DE DIFFERENTES INTERVENTIONS

FISTULISANTES

372 YEUX

Type intervention	Nb. Yeux	T.O. contrôlée		Echec
1 - Iridencleisis				
glaucome à angle étroit	69	58	84 %	11
glaucome chronique simple	72	60	85 %	12
TOTAL	141	118	83 %	23
2 - Iridectomie type SCHEIE				
glaucome à angle étroit	51	50	98,2 %	) 17
glaucome chronique simple	111	90	81 %	
TOTAL	162	140	86 %	
3 - Trépanation d'ELLIOT				
glaucome chronique simple	69	68	98,5 %	1

Glaucome à angle étroit

120

{ 69 CLEISIS 84 %
{ 51 SCHEIE 90,4 %

Glaucome chronique simple

252

{ 72 CLEISIS 85 %
{ 111 SCHEIE 86 %
{ 69 ELLIOT 97,4 %

1931. J. 20. 1. 1. 1.

Q. I have a question about the 1992-1993 season. Did you have any problems with the weather?

COMPLICATIONS POST-OPERATOIRES

AUTEURS	Retard formation CA	Hyphema	Oedème cornéen	Issue vitré	Glaucome malin	Cristal lin opacifi
SCHEIE 162 Yeux	60 37 %	17 10 %	2 1,2 %	1 0,6 %	3 1,8 %	? ?
BOUNDS 105 Yeux	11 10 %	11 10 %				19 18 %
TYNER- ARNOLD 72 Yeux	28 38,8 %	8 11 %		2		5 6,9 %
SCHEIE 137 Yeux	25 18,2 %	23 16 %		1		

RESULTATS DU SERVICE

[illegible]

Parmi les dossiers que nous avons relevés, les interventions selon la technique de SCHEIE n'ont été pratiquées qu'à partir de 1965.

Notre matériel comprend soixante dix huit patients,
soit quatre vingt dix sept yeux.

Ils sont répartis de la manière suivante :

- glaucomes à angle fermé : 28
- glaucome chronique : 43
 - . neuf tonométriques
 - . trente quatre campimétriques
- glaucomes secondaires : 17
 - . cinq Th.V.C.R.
 - . trois aphakes
 - . deux subluxations traumatiques du cristallin
 - . deux irido-cyclites
 - . deux glaucomes hémorragiques
 - . un décollement de rétine absolu
- glaucomes juvéniles : 6
- glaucomes congénitaux : 2
- glaucome infantile : 1

RESULTATS DU SERVICE

TYPE	Nombre d'Yeux	Bons résultats TO < 18	H.T.O. résiduelle contrôlée	Echecs	Opacités cristal- liniennes
Glaucome par fermeture de l'angle	28	24 86 %	2 7 %	2 7 %	13 46 %
Glaucome chronique	43	36 81,5 %	7 15 %	2 4 %	11 39 %
Glaucome secondaire	17	6 37 %	1 6 %	9 56 %	?
Glaucome juvénile	6		5	1	?
TOTAL	94				

ETUDE COMPARATIVE pour glaucome par fermeture
de l'angle

	Normalisation tensionnelle	H.T.O. résiduelle contrôlée	H.T.O. résiduelle non contrôlée	Opacités cristal- liniennes
Iridectomie 33 cas	27 81 %	5 15,5 %	1 3,5 %	10 30 %
Scheie 28 yeux	24 86 %	2 7 %	2 7 %	13 46 %
Iridencleisis 57 yeux	47 83 %	8 14 %	2 4 %	22 38 %
TOTAL 118 yeux	98 83 %	15 12,7 %	5 4,3 %	45 38 %

THE HISTORY OF THE UNITED STATES

1776-1876

1776-1800	1800-1820	1820-1840	1840-1860	1860-1876
1776-1800	1800-1820	1820-1840	1840-1860	1860-1876
1776-1800	1800-1820	1820-1840	1840-1860	1860-1876
1776-1800	1800-1820	1820-1840	1840-1860	1860-1876
1776-1800	1800-1820	1820-1840	1840-1860	1860-1876

COMPLICATIONS

Complications	Sur 97 yeux	T.O. contrôlée	Contrôlés sous traitement	Echecs
C.A. plate	10 10,1 %	10	0	0
Hyphema	10 12 %	6	2	4
Décollement choroïdien	28 28 %	21	6	1
A.V. modifiée	25 43 % sur 58 yeux	7	0	1

Table 1

Ref	Project Name	Country	Year	Value (M\$)
C				

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

CHICAGO, ILLINOIS

TO THE PRESIDENT OF THE UNIVERSITY OF CHICAGO
FROM THE DEAN OF THE FACULTY
SUBJECT: [illegible]

[illegible text]

[illegible text]

[illegible text]

[illegible text]

[illegible text]

[illegible text]

[illegible text]

[illegible text]

2) dans le glaucome chronique

- bons résultats : 81,5 %
- opacités cristalliniennes : 36,6 %

Les glaucomes secondaires n'ont pas donné de bons résultats dans les cas d'hypertonie avec thrombose de la veine centrale de la rétine mais la tension oculaire a été normalisée dans les glaucomes de l'aphake et dans les glaucomes post-uvéites.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

DEPARTMENT OF THE HISTORY OF ARTS

RECEIVED

1961

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

DEPARTMENT OF THE HISTORY OF ARTS

RECEIVED

1961

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

1961

CONCLUSIONS

[illegible]

Si l'on en juge par ces résultats, l'iridectomie filtrante de Scheie constitue une intervention fistulisante tout à fait valable au même titre que l'iridenclésis ou l'intervention d'Eliott (plus de quatre vingt pour cent de normalisation tensionnelle).

Il s'agit d'une intervention simple dans sa réalisation. Elle nécessite cependant l'usage d'un bon cautère réglable, qui ne chauffe pas trop.

Ces complications post-opératoires que nous avons observées ne sont pas plus importantes que celles des autres interventions fistulisantes. La fréquence des opacités cristalliniennes constatées en post-opératoires dans notre statistique apparaît certes plus grande que dans les autres types d'interventions fistulisantes, mais cette différence ne s'observe que pour le glaucome par fermeture de l'angle et ne tient pas compte de l'existence ou non d'opacité cristallinienne pré-opératoire.

Les indications de l'iridectomie filtrante sont celles de toute intervention fistulisante. Il paraît cependant logique de l'appliquer surtout aux glaucomes par fermeture de l'angle et aux glaucomes chroniques à angle étroit. Elle a pu, selon

131

131

131

131

131

131

131

131

131

131

131

131

131

131

131

131

131

131

131

131

131

certain auteurs, donner de bons résultats dans le glaucome juvénile et le glaucome congénital, là où la goniotomie a échoué ou n'a pu être pratiquée. Enfin elle peut être associée à l'extraction de la cataracte dans le cas d'une extraction combinée.

VU, le Président de Thèse,

VU, le Doyen,

M. le Professeur OFFRET

M. le Professeur BROUET

VU, le Recteur,

M. ROCHE

7 - DESMERS J.P. -

Les opérations filtrantes dans le glaucome chronique simple.

Union méd. du Canada, tome 96-7, 1967.

8 - DOUGLAS A.H.G., RAMSELL T.G. -

Results of preoperative antiglaucomatous treatment and of Scheie's operation.

Brit. J. Ophtal. 53, 7, 472-476, 1969.

9 - FARNARIER G., RAMPIN S. & RUANET G. -

L'iridectomie filtrante de Scheie et ses indications
Bull. Soc. Oph. France, tome 66-10, 1015-1019,
oct. 1966.

10- FARNARIER G., RAMPIN S. & LANCON M. -

Essai de traitement des glaucomes hémorragiques par
glycérol et iridectomie filtrante.

Bull. Soc. Oph. France, tome 66-4, 448-454, 1966.

11- HERVOUET F. -

Modification de l'opération de Scheie.

Films présentés Soc. Fr. Oph., 1965.

12- LEGRAND J., HERVOUET F. -

Les glaucomes de l'aphake.

Rapport Soc. Fran. Oph. 18 Avril 1964.

13- LEGRAND J. -

Que faut-il penser de l'opération combinée glaucome
cataracte ?

Docum. Ophtal. Den Haag 1966 - 20, 272-277.

$$= \dots = \text{infinit} = 5$$

It is clear that the system is not stable.

Let $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ be a sequence of real numbers.

$$x_1, x_2, \dots, x_n, \dots = 0$$

Let $\{y_n\}_{n=1}^{\infty}$ be a sequence of real numbers.

$$y_1, y_2, \dots, y_n, \dots = 0$$

Let $\{z_n\}_{n=1}^{\infty}$ be a sequence of real numbers.

$$z_1, z_2, \dots, z_n, \dots = 0$$

Let $\{w_n\}_{n=1}^{\infty}$ be a sequence of real numbers.

$$w_1, w_2, \dots, w_n, \dots = 0$$

Let $\{v_n\}_{n=1}^{\infty}$ be a sequence of real numbers.

$$v_1, v_2, \dots, v_n, \dots = 0$$

Let $\{u_n\}_{n=1}^{\infty}$ be a sequence of real numbers.

$$u_1, u_2, \dots, u_n, \dots = 0$$

Let $\{t_n\}_{n=1}^{\infty}$ be a sequence of real numbers.

$$t_1, t_2, \dots, t_n, \dots = 0$$

Let $\{s_n\}_{n=1}^{\infty}$ be a sequence of real numbers.

$$s_1, s_2, \dots, s_n, \dots = 0$$

Let $\{r_n\}_{n=1}^{\infty}$ be a sequence of real numbers.

$$r_1, r_2, \dots, r_n, \dots = 0$$

Let $\{q_n\}_{n=1}^{\infty}$ be a sequence of real numbers.

$$q_1, q_2, \dots, q_n, \dots = 0$$

Let $\{p_n\}_{n=1}^{\infty}$ be a sequence of real numbers.

$$p_1, p_2, \dots, p_n, \dots = 0$$

Let $\{o_n\}_{n=1}^{\infty}$ be a sequence of real numbers.

- 14 - LIU-YING-CH'I, TS'UI MO & MENG KUEI-CH'IN -
Scheie - Malbran's filtering operation for glaucoma.
Chin. Med. J., 83, 52-57, 1964.
- 15 - MAC LEAN -
The combined cataract glaucoma problem.
Trans. Pennsylvania. Acad. Opht. 12-19, 1963.
- 16 - MAC LEAN A.L. -
Limbal lip cautery for glaucoma.
Arch. of Opht. 71-5, 653-661, 1964.
- 17 - MALBRAN J. and MALBRAN E. -
Consideraciones sobre et tratamiento quirurgico
del glaucoma.
Arch. Oftal. B. Aires 32, 295, 1957.
- 18 - MALBRAN E. -
Glaucoma Surgery.
Trans. Am. Acad. Ophtal. Oto. 62, 630, 1958.
- 19 - MALBRAN J. & MALBRAN E. -
Surgical management of Primary Glaucoma.
Am. J. Opht., 47, 34, janv. 1959.
- 20 - MALBRAN E. -
Chirurgie de la cataracte simple et de la cataracte
avec glaucome.
Soc. Fr. Oph. Paris, mai 1965.

The first of these is the fact that the
the first of these is the fact that the

the first of these is the fact that the

the first of these is the fact that the

the first of these is the fact that the

the first of these is the fact that the

the first of these is the fact that the

the first of these is the fact that the

the first of these is the fact that the

the first of these is the fact that the

the first of these is the fact that the

the first of these is the fact that the

the first of these is the fact that the

the first of these is the fact that the

the first of these is the fact that the

the first of these is the fact that the

the first of these is the fact that the

the first of these is the fact that the

the first of these is the fact that the

the first of these is the fact that the

the first of these is the fact that the

the first of these is the fact that the

the first of these is the fact that the

21 - MALBRAN E. & NORBIS A. -

Filtering iridectomy : surgical management, complications and results.

South. Am. Symp. Glaucoma 1966.

Mod. Prob. Oph., 6, 132-147, 1968.

22 - MELLER J. -

Ophthalmic Surgery (1952).

23 - MENEZZO J.L. -

Nuestro proceder quirurgico en la extraction de la cataracta en pacientes glaucomatosos.

Arch. Soc. Oftal. hisp-amer. 1965, 25, 3, 225-252.

24 - MIKUNI M. -

Results of peripheral iridectomy with scleral cautery after Scheie (En Japonais)

Jap. J. Ophtal. 21, 3, 387-404, 1967.

25 - NADEL A.J. -

Sclerotomy with cautery. A review of 110 operations.

Am. J. Opht., 62-5, 955-962, 1966.

26 - NORBIS A., MASSANISSO J. and PESCE E. -

Glaucoma maligno III.

Jornadas Rioplatenses de Oftalmologia Déc. 65.

27 - OFFRET G., BREGEAT P., DEMAILLY P., HAUT J., HAYE C.,

MORAX P.V. -

Les techniques chirurgicales dans le glaucome chronique.

Table Ronde Paris 10 Jan. 1966.

28 - OISHI P. -

Choroidal detachment following Scheie's peripheral iridectomy with scleral cautery for glaucoma.

Jap. J. Clin. Ophtal. Tokyo 18, 7, 795-799, 1964.

29 - ORZALESI F., VERDI G.P. -

Prevenzione e trattamento di alcune complicanze post-operatorie nella chirurgia del glaucoma.

Atti. Soc. Oftal. Lombarda 21, 2, 165-188, 1966.

30 - PAUFIQUE L., BONAMOUR G. et BONNET M. -

La fistulisation externe des cicatrices filtrantes d'opérations antiglaucomateuses.

Anal. Inst. Barraque 240-263 (April 1965).

31 - PAUFIQUE L. et BONNET M. -

Réfection des cicatrices filtrantes antiglaucomateuses
Indications et technique.

Ann. Oculist. 147, 9, 886-893 (1964).

32 - PAUFIQUE L. -

Les glaucomes de l'aphake.

Soc. Oph. Paris 1964.

33 - POLYCHRONAKOS D. -

Scheie's operation.

Arch. Ophtal. Hetair borei-Hellad, 12, 130-147, 1963.

34 - POLYCHRONAKOS D.J. -

Die operative Behandlung des sekundären Glaukoms.

Verein. bayerischer Augenärzte; 30 April 1967.

[illegible]

$\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & i \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

[illegible]

1. *Phragmites australis* (Cav.) Trin. ex Steud.

35 - POLYCHRONAKOS D.J. -

Modification of Scheie's fistulising operation for glaucoma.

Arch. Opht., Chicago, 79, 736-737, 1968.

36 - PRESLES-BOUAZIZ D. -

Complications et résultats de quelques cas d'interventions mixtes pour glaucome et cataracte.
Thèse Paris 1967.

37 - PREZIOSI L. -

Electrocautery in the traitement of glaucoma.
British J. Opht., 8, sept. 1924.

38 - PREZIOSI L. -

Results of the electrocautery puncture in the traitement of glaucoma.
XIIIème Concil. Oph. Amsterdam, 1929.

39 - PREZIOSI L. -

Twenty five years of galvano-cautery puncture in the traitement of glaucoma.
XVI° Interna. Cong. Opht., London, 1950.

40 - SAKIC D. -

Beitrag zur Staroperationen im glaukomatosen Augen.
Ber. Dtsch. Opht. Ges. 1960, 63, 350-354.

41 - SCHEIE H.G. -

Electrocoagulation of the sclera; reduction in ocular volume and pathologic changes produced.
Am. J. Ophtal. 36, 6, 11, 60-78, 1949.

Figure 1. Schematic representation of the experimental design. The subjects were divided into two groups: a control group and an experimental group. The control group received a standard training program, while the experimental group received a training program with a focus on the specific skills required for the task. The results of the training program were compared between the two groups.

$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} \right) = \frac{\partial L}{\partial x}$

11-6-64

1000

42 - SCHIE H.G. -

Retraction of scleral wound edges as a fistulising procedure for glaucoma.

Am. J. Opht., 45, 220, 1958.

43 - SCHIE H.G. -

Peripheral iridectomy with scleral cautery for glaucoma.

Arch. of Opht., 61, 291, 1959.

44 - SCHIE H.G. -

Filtering operation for glaucoma : a comparative study.

Am. J. Opht. 53, 571, 1962.

45 - SCHIE H.G. -

Peripheral iridectomy with scleral cautery in congenital and juvenile glaucoma.

Arch. of Opht., 69, 13-22, 1963.

46 - SCHIE H.G. -

Trans. Opht. Soc U.K., 84, 127-137, 1964.

47 - SCHIE H.G. -

The surgical management of primary glaucoma.

Trans. Pacif. Cat. Oto-Opht. Soc., 45, 215-222, 1964.

48 - SUREVILLE P. -

Les cicatrices filtrantes des interventions anti-glaucomateuses.

Thèse Lyon 1968.

1. The first part of the report is devoted to a general

introduction.

2. The second part contains a detailed description of the

methodology used in the study.

3. The third part presents the results of the analysis.

4. The fourth part discusses the implications of the findings.

5. The fifth part concludes the report.

6. The sixth part contains the references.

7. The seventh part contains the appendices.

8. The eighth part contains the index.

9. The ninth part contains the summary.

10. The tenth part contains the conclusions.

11. The eleventh part contains the acknowledgments.

12. The twelfth part contains the list of figures.

13. The thirteenth part contains the list of tables.

14. The fourteenth part contains the list of abbreviations.

15. The fifteenth part contains the list of symbols.

16. The sixteenth part contains the list of equations.

17. The seventeenth part contains the list of formulas.

18. The eighteenth part contains the list of diagrams.

19. The nineteenth part contains the list of graphs.

20. The twentieth part contains the list of charts.

21. The twenty-first part contains the list of maps.

22. The twenty-second part contains the list of photographs.

23. The twenty-third part contains the list of illustrations.

42 - SCHEIE H.G. -

Retraction of scleral wound edges as a fistulising procedure for glaucoma.

Am. J. Opht., 45, 220, 1958.

43 - SCHEIE H.G. -

Peripheral iridectomy with scleral cautery for glaucoma.

Arch. of Opht., 61, 291, 1959.

44 - SCHEIE H.G. -

Filtering operation for glaucoma : a comparative study.

Am. J. Opht. 53, 571, 1962.

45 - SCHEIE H.G. -

Peripheral iridectomy with scleral cautery in congenital and juvenile glaucoma.

Arch. of Opht., 69, 13-22, 1963.

46 - SCHEIE H.G. -

Trans. Opht. Soc U.K., 84, 127-137, 1964.

47 - SCHEIE H.G. -

The chirurgicall management of primary glaucoma.

Trans. Pacif. Cst. Oto-Opht. Soc., 45, 215-222, 1964.

48 - SOURDILLE P. -

Les cicatrices filtrantes des interventions anti-glaucomeuses.

Thèse Lyon 1968.

1. The first part of the paper is devoted to a general discussion of the problem.

2. In the second part we shall consider the case of a homogeneous medium.

3. The third part is devoted to the case of an inhomogeneous medium.

4. In the fourth part we shall consider the case of a medium with a boundary.

5. The fifth part is devoted to the case of a medium with a source.

6. In the sixth part we shall consider the case of a medium with a sink.

7. The seventh part is devoted to the case of a medium with a well.

8. In the eighth part we shall consider the case of a medium with a fracture.

9. The ninth part is devoted to the case of a medium with a fault.

10. The tenth part is devoted to the case of a medium with a reservoir.

11. The eleventh part is devoted to the case of a medium with a well and a fracture.

12. The twelfth part is devoted to the case of a medium with a well and a fault.

13. The thirteenth part is devoted to the case of a medium with a well and a reservoir.

14. The fourteenth part is devoted to the case of a medium with a well and a fracture and a fault.

15. The fifteenth part is devoted to the case of a medium with a well and a fracture and a reservoir.

16. The sixteenth part is devoted to the case of a medium with a well and a fracture and a fault and a reservoir.

17. The seventeenth part is devoted to the case of a medium with a well and a fracture and a fault and a reservoir and a source.

18. The eighteenth part is devoted to the case of a medium with a well and a fracture and a fault and a reservoir and a source and a sink.

19. The nineteenth part is devoted to the case of a medium with a well and a fracture and a fault and a reservoir and a source and a sink and a well.

20. The twentieth part is devoted to the case of a medium with a well and a fracture and a fault and a reservoir and a source and a sink and a well and a fracture.

56 - TYNER G. & ARNOLD C. -

Peripheral iridectomy with scleral cautery.

Arch. of Opht., 68, 581, 1962.

57 - WOILLÉZ M., BLERVACQUE A. & WWAUREBOMCO Ch. -

Décollement choroïdien dans les interventions combinées.

Bull. Soc. Fran. Opht. 1, janv. 1968.

58 - YAMANOUCHI U. -

A histopathological study after operation of Scheie.

Jap. J. Clin. Ophtal. 21, 5, 704, 1967.

59 - ZUCCOLI A. -

L'iridectomie basale filtrante.

Atti. Soc. Oftal. Lombarda 1965, 20, 2, ~~175~~ 183.

-:-:-:-:-

56 - TYNER G. & ARNOLD C. -

Peripheral iridectomy with scleral cautery.

Arch. of Ophth., 68, 287, 1962.

57 - WOLFEZ M., BLERVAQUE A. & WAUREBOMOD C. -

Décollement choroidien dans les interventions

oculaires.

Bull. Soc. Franç. Ophth., 1, Janv. 1968.

58 - YAMAMOTO U. -

A histopathological study after operation of Schale.

Jap. J. Clin. Ophth., 21, 2, 704, 1967.

59 - WOODS A. -

Iridectomy par la klistère.

Atti. Soc. Ital. Lombarda 1965, 20, 2, 475-483.

